

Sandy's Fire, S.A. de C.V.



DILUYENTE / REDUCTOR PARA PINTURAS (Diluyente TX-1)

PRESENTACION 4 LITROS CODIGO 550-R059

DESCRIPCION GENERAL:			USOS:		
Diluyente o reductor para pintura o poliuretano color TR presentacion 4 litros.			TX1:	Para limpiar cochambre, remover otras pinturas, para acabados de bajo brillo y acabados dry fall (secado inmediato)	
			TX2:	Para remover pinturas y recubrimientos de mediano	
			TX3:	Para recubrimientos de alto brillo.	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:			IMPACTO AMBIENTAL: Moderado		
Son disolventes universales, libres de acetona que tienen diferentes usos dependiendo su velocidad de evaporacion, como se explica en la tabla:			FLAMABILIDAD: Nivel 3 (alto)		
			EQUIPO DE PROTECCION: Usar casco, guantes de hule, lentes de protección con guardas laterales, mascarilla contra vapores de solventes orgánicos, zapatos antiderrapantes, ropa adecuada para el pintado.		
CONCEPTO	REMOVEDOR O LIMPIADOR	PINTURAS INDUSTRIALES	PINTURAS AUTOMOTIVAS	EVAPORACION	COSTO
Diluyente Tx 1	SI	SI	SI	MUY RAPIDO	+
Diluyente Tx 2	SI	SI	SI	MODERADO	++
Diluyente Tx 3	NO	SI	NO	LENTO	+++
ADVERTENCIA:			RIESGO:		
NO dejar al alcance de los niños			Moderado ya que contiene solventes inflamables.		
NO usar en lugares cerrados o sin ventilacion			MANEJO:		
NO usar cerca del fuego o de chispas			Uso industrial y debe ser usado por personal capacitado.		
NO mezclar con otros productos.			Utilizar en lugares ventilados con sombra.		
NO quitar etiquetas del envase			TOXICOLOGIA E IMPACTO ECOLOGICO		
NO tirar contenido al drenaje			Mandar incinerar el producto residual.		
Solo para Fuego clase 1			Moderadamente dañino para el medio ambiente y personas		
PRIMEROS AUXILIOS:				ALMACENAJE:	
INGESTION	NO provocar vomito consultar al medico			Puede tener una resistencia de 1 año en almacen, fresco a 21° y bien cerrado.	
CONTACTO CON LOS OJOS	Chorro de agua fria 15 minutos; consultar al medico.				
CONTACTO CON LA PIEL	Agua fria 15 minutos, consultar al medico.				
INHALACION	En caso de mareo o nauseas ir a una zona con aire fresco, consultar al medico.				